

ロピニロール徐放錠「サワイ」を 服用される患者さんをご家族の方へ

このお薬を正しく服用するため、飲む前に
必ずお読みください。



このお薬を飲むと、急に眠くなったり、前ぶれもなく
眠り込んでしまうことがあります(突発的睡眠^{とつぱつてきすいみん})。
飲み始めて1年以上経ったあとにあらわれる場合
もあります。

**車の運転、危険を伴う機械の操作、
高い場所での作業などはしないでください!**

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、欲求
や行動を抑えることが難しくなる、『衝動制御障害^{しょうどうせいぎよしょうがい}
(病的賭博、強迫性購買、病的性欲亢進、暴食など)』
がおこることがあります。



裏面もご覧ください。

その他の注意点

- できるだけ毎日同じ時間帯に飲んでください。
- 必ず医師の指示に従って服用してください。
自分の判断で飲む量を変えたり、服用を中止したりしないでください。
- このお薬はゆっくり溶けだし、長時間作用します。
割ったり砕いたりせず、そのまま噛まずに飲んでください。
- 便の中にこのお薬が見つかった場合は、十分な効果が得られないことがありますので、医師または薬剤師に相談してください。
- このほかにも、気になることがあれば、医師または薬剤師に相談してください。

次のような症状があらわれたときは、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- ◎急な眠り込み、ひどい眠気
- ◎幻覚、妄想
- ◎衝動制御障害
- ◎発熱、意識がぼんやりする
- ◎めまい、ふらつき
- ◎筋肉がひどくこわばる

医療機関名